

Perifar

Cafeína

Spedar

Ibuprofeno - Cafeína

Vía oral

Fórmula

Cada comprimido recubierto contiene:

Ibuprofeno	400 mg
Cafeína	50 mg
Excipientes	C.S.

Indicaciones

Dolores de cualquier etiología que requieran el rápido alivio de un analgésico potenciado.

Propiedades farmacológicas. La cafeína tiene algunas propiedades analgésicas propias y debido a su rápida absorción y distribución, es útil como adyuvante en combinación con el Ibuprofeno, el analgésico de uso más frecuente y generalmente considerado el más seguro.

Su efecto analgésico es periférico, haciendo racional su combinación con un agente de acción central como la Cafeína. Los estudios clínicos han comprobado que ésta aumenta el efecto analgésico en un 40%.

Perifar Cafeína está formulado para el rápido alivio de las manifestaciones dolorosas de diversa causa. Alivia el cansancio físico y promueve un estado de alerta.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida al Ibuprofeno. Úlcera gastroduodenal en actividad. Insuficiencia hepática o renal, trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea.

Precauciones de uso

Al igual que otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE's) debe ser administrado con precaución a pacientes con antecedentes de asma y broncoespasmo. El Ibuprofeno, al igual que todos los AINE's debe utilizarse con precaución en pacientes hipertensos. Su uso prolongado debe ser vigilado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Otros efectos adversos comunes a este grupo, incluyen alteraciones de la función renal.

Fertilidad

No hay informes de alteraciones en la fertilidad con el uso de **Perifar**.

Embarazo

El uso del **Perifar** durante el primer y segundo trimestre del embarazo, no se ha asociado con un aumento general en el riesgo de malformaciones congénitas. Su empleo regular y continuo durante el tercer trimestre debe ser controlado por un médico por el riesgo del cierre prematuro del ductus arterioso en el feto, inhibición del trabajo de parto o reducción del líquido amniótico.

Lactancia

No se observaron efectos adversos en lactantes cuyas madres estaban recibiendo Ibuprofeno y se considera que su empleo es compatible con la lactancia. Se considera que la cantidad de Ibuprofeno en la leche materna es muy pequeño para que sea dañino para el lactante.

Pediatría

Perifar Cafeina no fue formulado y no debe emplearse en menores de 15 años.

Interacciones

Se ha sugerido que **Perifar** podría reducir el efecto cardioprotector de la Aspirina. Las interacciones del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos incluyen el incremento de los efectos de los anticoagulantes orales. El uso de más de un antiinflamatorio no esteroideo (incluida Aspirina) debe ser evitado debido al incremento del riesgo de efectos adversos.

Posología

Según prescripción médica.

Como dosis de orientación se recomienda 1 comprimido cada 8 horas. No se deberían exceder los 3 comprimidos diarios, salvo mejor indicación médica. Como dosis de ataque pueden tomarse 2 comprimidos juntos al inicio del tratamiento.

Presentación: envase conteniendo 8 comprimidos.

Ley 15443, Reg. Lab. Nº 83. Reg. M.S.P. Nº 41600

CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.

Mantener alejado del alcance de los niños.

Conservar entre 15° C y 30° C, en lugar seco.

D.T.: Quím. Farm. Alicia Cayota

Spefar S.A. Av. Millán 3907 - Montevideo

Industria Uruguaya.